CCES SALUD

CONGRESO IBEROAMERICANO EN EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS

**CONGRESO IBEROAMERICANO
EN EMERGENCIAS Y CUIDADOS
CRÍTICOS**

Urgencia
hipertensiva

¿Existe?

¿Cuándo hay hipertensión arterial?

Presión sistólica y diastólica (mmHg)	Guía JNC7	Guía 2017 ACC/AHA
< 120 y < 80	Normal	Normal
120-129 y < 80	Prehipertensión	Elevada
130-139 o 80-89	Prehipertensión	Hipertensión
		Estadio 1
140-159 o 90-99	Hipertensión	Hipertensión
	Estadio 1	Estadio 2
> 160 o > 100	Hipertensión	Hipertensión
	Estadio 2	Estadio 3

JNC7: 7º Reporte del Comité Nacional Norteamericano

140/90

130/80

Factores de riesgo adicionales	PA límite PAS 130-139 mmHg PAD 85-89 mmHg	Nivel 1 PAS 140-159 mmHg PAD 90-99 mmHg	Nivel 2 PAS 160-179 mmHg PAD 100-109 mmHg	Nivel 3 PAS $\geq$ 180 mmHg PAD $\geq$ 110 mmHg
Sin factores de riesgo	Riesgo promedio	Bajo riesgo	Moderado riesgo	Alto riesgo
1-2 factores de riesgo adicionales	Bajo riesgo	Moderado riesgo	Moderado riesgo	Muy alto riesgo
3 factores de riesgo DOB – asintomático - DM	Alto riesgo	Alto riesgo	Alto riesgo	Muy alto riesgo
Condición clínica asociada	Muy alto riesgo	Muy alto riesgo	Muy alto riesgo	Muy alto riesgo

HTA: ¿está controlada?

Benjamin, Emelia J., et al. "Heart disease and stroke statistics—2017 update: a report from the American Heart Association." *circulation* 135.10 (2017): e146-e603.

Evolución del grado de conocimiento y control de la hipertensión arterial en la Argentina

Janke, Alexander T., et al. "Trends in the incidence of hypertensive emergencies in US emergency departments from 2006 to 2013." *Journal of the American Heart Association* 5.12 (2016): e004511.

**Hipertensión arterial
No controlada**

**Emergencias
hipertensivas**

**Hipertensión
severa**

**Hipertensión
arterial en
emergencias**

**Crisis
hipertensivas**

**Hipertensión
maligna**

**Urgencias
hipertensivas**

CCES SALUD

Crisis hipertensiva = HTA no controlada

Emergencia hipertensiva

Urgencia hipertensiva

CCES SALUD

Crisis hipertensiva = HTA no controlada

Emergencia hipertensiva

Urgencia hipertensiva

CCES SALUD

Emergencia Hipertensiva

Situación clínica o subclínica que pone en riesgo inminente la vida del paciente, caracterizada por la presencia de daño agudo de órgano blanco, en la cual la elevación de la TA cumple un rol patogénico fundamental en la génesis y progresión del mismo.

La emergencia se define por la gravedad del cuadro clínico, independientemente del valor absoluto de aumento de la TA.

Emergencia Hipertensiva

Las emergencias hipertensivas se definen como elevaciones severas en la PA (> 180/120 mm Hg) asociadas con la evidencia de un nuevo o empeoramiento del daño al órgano blanco.

Emergencia Hipertensiva

- ❖ **Encefalopatía Hipertensiva.**
- ❖ **Insuficiencia Cardíaca Izquierda Aguda (E.A.P.)**
- ❖ **Diseccción Aórtica Aguda**
- ❖ **Infarto Agudo de Miocardio - Angina Inestable**
- ❖ **Preeclampsia Grave – Eclampsia**
- ❖ **Insuficiencia renal aguda**

Emergencia Hipertensiva

- ✓ **Incidencia: 1-2 % de pacientes hipertensos**
- ✓ **Tasa de mortalidad a 1 año: 79%**
- ✓ **Sobrevida: 10,4 meses si la emergencia se deja sin tratar.**

Emergencia Hipertensiva

Tratamiento

Recomendaciones para emergencias hipertensivas en adultos

Clase	Nivel	Recomendaciones
I	B-NR	En adultos con una emergencia hipertensiva, se recomienda el ingreso a una unidad de cuidados intensivos para la monitorización continua de la PA y el daño de órganos diana y para la administración parenteral de un agente apropiado
I	C-E0	Con una afección apremiante (es decir, disección aórtica, preeclampsia o eclampsia grave o crisis de feocromocitoma), la PAS debe reducirse a menos de 140 mm Hg durante la primera hora y a menos de 120 mm Hg en la disección aórtica.
I	C-E0	Sin una afección apremiante, la PAS no debe reducirse en más del 25% durante la primera hora; luego, si está estable, a 160/100 mm Hg en las próximas 2 a 6 hs; y luego con precaución a la normalidad durante las siguientes 24 a 48 horas.

HTA + ACV

ACV isquémico

ACV hemorrágico

CCES SALUD

Recomendaciones para emergencias Hipertensivas en adultos con ACV hemorrágico		
Clase	Nivel	Recomendaciones
Ila	C-E0	En adultos con HIC que presenten PAS superior a 220 mm Hg, es razonable utilizar una infusión intravenosa continua de fármacos y una monitorización estrecha de la PA para disminuir la PAS.
III: Harm	A	La reducción inmediata de la PAS a menos de 140 mm Hg en adultos con HIC espontánea que se presentan dentro de las 6 hs posteriores al evento agudo y tienen una PAS entre 150 y 220 no es beneficiosa para reducir la muerte o la discapacidad grave y puede ser dañino

Emergencia Hipertensiva: tratamiento

Control de la TA en horas

20-25 % del nivel inicial en 2 horas

Medicación endovenosa

Internación en Unidad de Cuidados Críticos

Crisis hipertensiva = HTA no controlada

Emergencia hipertensiva

Urgencia hipertensiva

CCES SALUD

Urgencia hipertensiva

Grupo heterogéneo de situaciones caracterizadas por HTA, correspondientes a PAS $\geq$ 180 mmHg y/o PAD $\geq$ 110 (120?) mmHg la cual puede presentarse en forma aislada o acompañando a distintas entidades con características fisiopatológicas y evolutivas propias

Urgencia hipertensiva

No hay indicación para:

- ✓ Derivarlos al servicio de emergencias
- ✓ Reducirles inmediatamente la TA en el servicio de emergencias
- ✓ Hospitalizar a estos pacientes

CCES SALUD

Urgencia hipertensiva

- ¿Qué test diagnóstico deben realizarse?
- ¿Debería reducirse la PA de forma aguda a algún umbral "seguro"?
- ¿Se deben prescribir a los pacientes medicamentos antihipertensivos orales crónicos?
- ¿Deben modificarse las prescripciones existentes?
- ¿Cuál es el marco de tiempo óptimo para el seguimiento de la atención primaria?
- ¿Qué intervenciones de educación y acceso se han hecho eficaces para mejorar la adherencia del paciente?
- ¿Los pacientes que ingresarán en el hospital requieren estrategias de manejo diferentes?

CCES SALUD

Urgencia hipertensiva: evaluación

Test diagnósticos

Urgencia hipertensiva: evaluación

Tratamiento

Urgencia hipertensiva: evaluación

Tratamiento oral/preexistente

CCES SALUD

Urgencia hipertensiva: tratamiento inicial

- **Terapia inicial: diuréticos similares a tiazidas**
- **Asociados a:**
 - **bloqueadores de los canales de calcio o**
 - **inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o**
 - **bloqueadores de los receptores de la angiotensina (BRA)**

CCES SALUD

No bajar TA a niveles normales

Morrison A, Vijayan A. Hypertension. In: The Washington manual of medical therapeutics. 32nd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 102–18.

Tuncel M, Ram V. Hypertensive emergencies. Am J Cardiovasc Drugs 2003;3(1): 21–31.

Dipiro J, Talbert R, Saseen JJ, et al. Pharmacotherapy. A pathological approach. 7th edition. p. 141–71.

Available at: <http://www.uptodate.com>. Accessed August, 2015.

Varon J, Marik P. Management of hypertensive crises. Crit Care 2003;7(5): 374–84.

Tulman DB, Stawicki SP, Papadimos TJ, et al. Advances in management of acute hypertension: a concise review. Discov Med 2012;13(72):375–83. Accessed July, 2015.

Slama M, Modeliar SS. Hypertension in the intensive care unit. Curr Opin Cardiol 2006;21:279–87. Lippincott Williams & Wilkins.

CCES SALUD

Urgencia hipertensiva

frontiers
in Cardiovascular Medicine

MINI REVIEW
published: 10 January 2017
doi: 10.3389/fcvm.2016.00051

Cardiovascular Hypertensive Crisis: Recent Evidence and Review of the Literature

Christos Varounis^{1}, Vasīlīki Katsi², Petros Nihoyannopoulos³, John Lekakis⁴ and
Dimitris Tousoulis⁵*

En casos con urgencia hipertensiva, el control de la TA
deberá estar orientado al uso de bajas dosis de
antihipertensivos orales con un descenso gradual de la
TA a través de horas o días

CCES SALUD

LES CRISES HYPERTENSIVES

XHIGNESSE P (1), KRZESINSKI F (2), KRZESINSKI JM (3)

Rev Med Liege 2018; 73 : 5-6 : 326-332

La mayoría de los pacientes con una TA severa (TAS > 180 mmHg, TAD > 120 mmHg) sin daño de órgano, el tratamiento óptimo es una disminución progresiva de la TA en 24-48 hs utilizando un tratamiento vía oral

CCES SALUD

G Model
YPHRS-3838: No. of Pages 11

ARTICLE IN PRESS

Pharmacological Research xxx (2018) xxx-xxx

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Pharmacological Research

ELSEVIER journal homepage: www.elsevier.com/locate/yphrs

Review

Acute blood pressure elevation: Therapeutic approach

Massimo Salvetti, Anna Paini, Fabio Bertacchini, Deborah Stassaldi, Carlo Aggiusti, Claudia Agabiti Rosei, Maria Lorenza Muiesan*

Department of Clinical and Experimental Sciences University of Brescia, 2a medicina Spedali Civili, Brescia, 25100, Italy

Todas las guías recomiendan en contra de la administración sublingual de nifedipina. A menudo el grado de descenso de la TA es muy rápido y durable que lo deseable

Urgencia hipertensiva: tratamiento inicial

	Patients presenting to ED		P value
	Referred by health professionals	Self-referred	
Number of patients	67	187	
Patients received an antihypertensive while in ED			0.21
Yes	21 (31.3)	44 (23.5)	
No	46 (68.7)	143 (76.5)

HTA en emergencias: TRATAMIENTO

- ♣ No dañar
- ♣ No hipoperfundir órganos isquémicos
- ♣ Evitar bajar rápidamente la TA
- ♣ Considerar contraindicaciones de los fármacos
- ♣ Considerar efectos adversos de los fármacos

Trate pacientes y no números

Urgencia hipertensiva: evaluación

Seguimiento

Urgencia hipertensiva: evaluación

Educación y acceso

CCES SALUD

¿Hay evidencia?

Emergency

- Sistema de salud de la Cleveland Clinic
- Estudio retrospectivo
- Pacientes atendidos en consultorios externos
- Con diagnóstico de urgencia hipertensiva (TA > 180/110)
- Evalúa destino (hospital u hogar) y evolución
- Total pacientes: 58.535
 - Derivados a su hogar: 58.109 (99.3%)
 - Derivados al hospital: 426 (0.7%)

Original Investigation

Characteristics and Outcomes of Patients Presenting With Hypertensive Urgency in the Office Setting

Krishna K. Patel, MD; Laura Young, MD; Erik H. Howell, MD; Bo Hu, PhD; Gregory Rutecki, MD; George Thomas, MD; Michael B. Rothberg, MD, MPH

Unadjusted Outcomes of Patients With Hypertensive Urgency

Outcome	No. (%) of Patients		P Value ^a
	Referred to Hospital (n = 426)	Sent Home (n = 58 109)	
MACE^c			
7 d	2 (0.5)	61 (0.1)	.02
8-30 d	2 (0.5)	119 (0.2)	.23
1-6 mo	4 (0.9)	492 (0.8)	.83
Uncontrolled hypertension			
1 mo	349 (81.9)	49 320 (84.9)	.09
6 mo	213 (66.6)	24 819 (60.2)	.02
All-cause hospital admission			
7 d	35 (8.2)	2311 (4.0)	<.001
8-30 d	48 (11.3)	3897 (6.7)	<.001

Abbreviation: MACE, major adverse cardiovascular events.

Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management
of Adult Patients in the Emergency Department With
Asymptomatic Elevated Blood Pressure

La hipertensión asintomática y la urgencia hipertensiva son términos que se utilizan con frecuencia para indicar presiones sanguíneas marcadamente elevadas sin evidencia clínica de lesión aguda de órganos diana con o sin el diagnóstico establecido de hipertensión.

Presión arterial gravemente elevada asintomática

=

HTA sin síntomas de disfunción de órgano blanco

Wolf, Stephen J., et al. "Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients in the emergency department with asymptomatic elevated blood pressure." *Annals of emergency medicine* 62.1 (2013): 59-68.

American College of
Emergency Physicians®

Presión arterial gravemente elevada asintomática

Exámenes complementarios
Tratamiento de emergencia

CCES SALUD

Wolf, Stephen J., et al. "Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients in the emergency department with asymptomatic elevated blood pressure." *Annals of emergency medicine* 62.1 (2013): 59-68.

Hoffman y Cooper dicen: "debemos reconocer la enorme diferencia entre una enfermedad que se presenta clínicamente y "la misma enfermedad" que se encuentra solo porque hemos decidido buscarla, en ausencia de una preocupación clínica convincente".

CCES SALUD

Hoffman JR, Cooper RJ. Overdiagnosis of disease: a modern epidemic. Arch Intern Med. 2012; 172(15):1123-1124

“Ante un paciente con hipertensión la urgencia está más en la mente del médico que en el cuerpo del paciente”

CCES SALUD

Urgencia

Una urgencia es la repentina aparición en cualquier lugar o circunstancia de un problema de diferentes causas y de gravedad variable que crea la necesidad apremiante de atención. Las condiciones urgentes pueden describirse como graves, pero, no amenazan la vida.

CCES SALUD

LESS IS MORE

Hypertensive Urgency—Is This a Useful Diagnosis?

Iona Heath, MB, BChir, FRCGP, FRCP

CCES SALUD

Heath, Iona. "Hypertensive urgency—is this a useful diagnosis?." JAMA internal medicine 176.7 (2016): 988-989.

Crisis hipertensiva = HTA no controlada

Emergencia hipertensiva

**Presión arterial
gravemente elevada
asintomática**

2022

CCES SALUD

MUCHAS GRACIAS

saguilera1953@Gmail.com